

SESIÓN CLÍNICA GENERAL – HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO
SERVICIO DE MATRONAS

PONENTE: DÑA. MARÍA DÁVILA MONZÓN

MODERADORA: DÑA. MÓNICA BLAS ROBLEDO

6 DE NOVIEMBRE DE 2020, 8:15 HORAS. SALÓN DE ACTOS GORBEIA (VÍA ZOOM)

AUTORES: DÁVILA M., LOZANAO P., MALAININ E., ARNAIZ A. y BLANCO A.

RESUMEN:

S.A.B. Gestante de 39+3 semanas acudió al servicio de Urgencias de Obstetricia y Ginecología refiriendo dinámica uterina muy dolorosa durante horas. La matrona tras valorar los signos y síntomas, ante la sospecha de posición occipito-posterior le ofreció varias recomendaciones prácticas con el fin de optimizar la posición fetal mediante movilización de la estructura pélvica y ayudarle a controlar el malestar producido por las contracciones. Transcurridas 15 horas y llevando a cabo los consejos de la profesional, la paciente volvió al servicio de Urgencias y fue ingresada en la unidad de Partos. Se administró analgesia epidural y se siguió el Protocolo de Atención al Parto Normal (1). Comenzó con un proceso de dilatación tórpida, causado principalmente por la malposición fetal. La matrona, haciendo uso de sus recursos, puso en práctica diferentes técnicas: ejercicios de esferodinamia, rebozo y cambios posturales. Después de dichas intervenciones se consiguió la rotación del feto, pasando de una posición occipito posterior a una occipito ilíaca izquierda anterior. En el siguiente tacto vaginal se objetivó la finalización de la dilatación, dando comienzo al proceso de expulsivo. S.A.G. parió mediante parte eutócico una RN mujer con apgar 9/10.